

Trabalhos Científicos

Título: Principais Causas De Óbitos Na Faixa Etária Neonatal Tardio Em Sergipe No Ano De 2023

Autores: CAMILA MENDONÇA FRANÇA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), GABRIELLA MELLO RUSCIOLELLI NUNES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), GABRIELA NEVES COSTA LEÃO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), CAMILLA KARINNE GUIMARÃES ROSA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), DAYANE DA SILVA OLIVEIRA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), RENATA CAROLYNE FERREIRA FARIAS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), KÍVIA NOVAES SANTANA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), ERELY RUAMA SANTOS SANTANA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), JÉSSICA TELES SANTANA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE), THIAGO MARQUES TAVARES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), TACIANNE PADILIA FERREIRA FARIAS (FACULDADE TIRADENTES)

Resumo: Considera-se óbito neonatal os óbitos ocorridos em menores de 28 dias de idade. Estes, por sua vez, são subdivididos em neonatal precoce (óbitos ocorridos nos 6 primeiros dias de vida) e neonatal tardio (entre 7 e 27 dias de vida completos). Identificar as principais causas de óbito neonatal tardio no estado de Sergipe no ano de 2023. A coleta de dados ocorreu através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) – TABNET, através de dados gerados pelo serviço de investigação de óbito infantil e fetal no ano de 2023 no estado de Sergipe. No ano de 2023 foi registrado um total de 91 óbitos em recém-nascido (RN) entre 7 e 27 dias de vida. A principal causa dos óbitos foi a septicemia (31%), seguido pela Enterocolite necrotizante do RN (13%) e em terceiro lugar por RN afetados por complicações maternas na gravidez (7%). Em uma menor proporção, apresentou-se o desconforto respiratório do RN (3%), a Pneumonia congênita (3%) e outras malformações congênitas do coração (3%). A principal causa de óbito neonatal tardio foi a septicemia. As mortes por septicemia neonatal são um grave problema de saúde em decorrência do custo elevado no tratamento e alta mortalidade. A sepsis tardia está relacionada a fatores após o nascimento, sendo comumente devido a múltiplos procedimentos invasivos como tubo endotraqueal, cateteres, punções venosas, nutrição parenteral e também ao risco de infecção por meio de transmissão horizontal. Medidas para melhoria da assistência hospitalar são necessárias para diminuição no número absoluto de óbitos nessa faixa etária.