

Trabalhos Científicos

Título: Infecção Por Varicela-Zoster Na Pediatria: Relato De Caso

Autores: ALYNE BARBOSA BRITO (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ), DÁRIA VEIGA DE MENEZES NETA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ), JANAÍNA DA SILVA NOGUEIRA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ), DELIA MARIA DE MOURA LIMA HERMANN (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ), RENATA MAIA VALENÇA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** O vírus varicela-zoster (VZV) pertence à família do herpes vírus e é responsável pela varicela e herpes zoster. A varicela geralmente acomete crianças e na maioria dos casos é leve e autolimitada. O herpes zoster na população infantil é raro. **DESCRIÇÃO DO CASO:** CVBS, sexo feminino, 4 anos, procedente de Maceió - Alagoas, foi levada ao Pronto Atendimento por apresentar lesões cutâneas vesiculares confluentes em mão, antebraço e braço esquerdo e uma lesão em região posterior superior do tórax, com base eritematosa e com calor local há 2 dias. Sem comorbidades e sem antecedentes prévios de varicela. Apresentava vacinação atualizada. A mãe não tinha história pessoal de varicela durante a gravidez. Na admissão, encontrava-se com bom estado geral e não apresentava alterações no restante do exame físico. Foi realizado teste rápido de HIV com resultado não reagente, prescrito tratamento ambulatorial com aciclovir e solicitado retorno em 48 horas para reavaliação. A paciente evoluiu bem clinicamente, apresentando lesões cicatriciais e sem outras queixas. **DISCUSSÃO:** O herpes zoster é muito raro na infância. Sua incidência é maior nos idosos e imunossuprimidos. Resulta da reativação do VZV latente em um gânglio sensitivo nervoso e é caracterizado por lesões vesiculares unilaterais e dolorosas, que normalmente ocorrem em um ou dois dermatômos. As principais causas de reativação nas crianças são infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), neoplasias, especialmente a leucemia, doenças autoimunes e uso de drogas imunossupressoras. Quando está relacionado ao HIV, o quadro pode ser mais grave e comprometer o sistema nervoso central da criança. **CONCLUSÃO:** Apesar da faixa etária pediátrica ser pouco acometida pelo Herpes Zoster, deve-se pensar na possibilidade do diagnóstico em lesões cutâneas sugestivas, uma vez que a identificação e tratamento precoce são de suma importância para que se tenha êxito na resolução da doença.