

## Trabalhos Científicos

**Título:** Uso De Buscopan (Butilbrometo De Escopolamina) Em Lactentes – Relato De Caso

**Autores:** CELSO TAQUES SALDANHA (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), ANA PAULA ALVES DA SILVA (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), SAMARA REIS SALLES PIRAJÁ (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), MOISES EDUARDO SOBRAL PIMENTEL (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), ANA CAROLINA DE SOUZA CABRAL DEUSCHLE DA SILVA (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), ERIK DAVID ALVES TOMAZ (FACULDADE MORGANA POTRICH FAMP)

**Resumo:** Cólica do lactente é uma condição comum em crianças, caracterizada por episódios de choro inconsolável e desconforto abdominal, geralmente ocorrendo em um padrão regular, frequentemente à noite. As possíveis causas incluem imaturidade do trato gastrointestinal e fatores ambientais e emocionais. As cólicas são mais frequentes entre as idades de 2 semanas a 4 meses e são igualmente comuns em ambos os sexos, embora alguns estudos sugiram uma ligeira predominância em meninos. Mãe refere que seu filho, de 4 meses de idade, nascido de parto cesáreo, a termo, adequado para a idade gestacional (AIG), com testes de triagem neonatal normais e sem intercorrências gestacionais ou neonatais, está apresentando cólicas intestinais intensas típicas de cólicas do lactente. É alimentado com leite materno complementado com fórmula desde a segunda semana de vida, apresenta desenvolvimento neuropsicomotor normal, crescimento adequado (peso, comprimento e perímetro cefálico), está em uso profilático de vitamina D e tem eliminações fisiológicas normais. A mãe, durante a consulta, menciona que vem administrando Buscopan Bebê (butilbrometo de escopolamina) em uma dosagem de 6 gotas, sem orientação pediátrica, e que não observou melhora no quadro de cólicas. As características apresentadas pela criança são compatíveis com cólica do lactente, condição benigna que geralmente se resolve por volta dos 4 meses de idade. Estatisticamente, a maioria dos casos de cólica do lactente diminui significativamente após os 3-4 meses de idade, com uma resolução completa em cerca de 90% dos casos até os 6 meses. Tratamento é predominantemente não farmacológico, conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Técnicas de conforto, massagens abdominais e uso de fórmulas especiais podem ser eficazes. O uso de medicamentos, como o Buscopan, não é recomendado devido à falta de evidências de eficácia e segurança nesta faixa etária, pois não é seguro para crianças pequenas devido ao risco de efeitos no sistema nervoso central e possíveis complicações no trato gastrointestinal. ANVISA, contraindica uso do medicamento em crianças menores de 6 anos sem orientação médica. É prudente não usar Buscopan devido à falta de evidências de eficácia e à possibilidade de efeitos adversos. A cólica do lactente, apesar de desconfortável e angustiante para os pais, é uma condição autolimitada que geralmente se resolve com o tempo. A abordagem não farmacológica é a mais segura e eficaz, conforme recomendado pela SBP.