



22 A 26  
DE OUTUBRO  
DE 2024  
FLORIANÓPOLIS - SC



## Trabalhos Científicos

**Título:** Urticária Aquagênica Associada À Infecção Viral: Relato De Caso Em Pré-Escolar Com Síndrome Mão-Pé-Boca

**Autores:** CELSO TAQUES SALDANHA (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), ANA PAULA ALVES DA SILVA (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), SAMARA REIS SALLES PIRAJÁ (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), MOISES EDUARDO SOBRAL PIMENTEL (CENTRO EDUCACIONAL UNIEURO ), ERIK DAVID ALVES TOMAZ (FACULDADE MORGANA POTRICH FAMP)

**Resumo:** A urticária aquagênica é uma condição dermatológica rara caracterizada pelo desenvolvimento de urticária após contato com água, independentemente da temperatura. Sua etiologia ainda é desconhecida, mas é geralmente considerada idiopática. Infecções virais têm sido associadas a diversas manifestações cutâneas, embora a relação específica com urticária aquagênica seja pouco documentada na literatura médica. Este relato descreve um caso de uma pré-escolar com síndrome mão-pé-boca que desenvolveu urticária aquagênica após a resolução dos sintomas agudos. Uma menina de 4 anos, sem histórico médico significativo, desenvolveu síndrome mão-pé-boca com febre, lesões orais e cutâneas características. Após a resolução dos sintomas agudos, aproximadamente 15 dias após o início da infecção, a criança começou a apresentar urticária eritematosa intensa em todo o corpo após o contato com água durante a higiene diária. O diagnóstico de urticária aquagênica foi feito com base nos achados clínicos e no teste de provocação com água. A urticária aquagênica é uma condição dermatológica incomum, especialmente em crianças, caracterizada por urticária transitória após exposição à água. A associação com infecções virais, como a síndrome mão-pé-boca causada por vírus Coxsackie, é sugerida por relatos isolados na literatura. A patogênese exata da urticária aquagênica permanece obscura, mas mecanismos imunológicos e de hipersensibilidade podem desempenhar um papel. A infecção viral pode atuar como um gatilho imunológico, induzindo uma resposta cutânea atípica após a exposição à água. No caso relatado, a temporalidade sugere uma possível conexão entre a infecção viral e a manifestação subsequente da urticária aquagênica. Este caso sugere uma possível associação entre a síndrome mão-pé-boca e o desenvolvimento subsequente de urticária aquagênica em uma criança pré-escolar. Embora a literatura médica ainda careça de estudos robustos sobre essa conexão específica, é importante considerar a possibilidade de que infecções virais, como a síndrome mão-pé-boca, possam desempenhar um papel desencadeante em condições dermatológicas atípicas como a urticária aquagênica. Mais pesquisas são necessárias para entender melhor essa associação e os mecanismos subjacentes, o que pode contribuir para melhores estratégias de manejo e tratamento dessas condições em crianças.