

## Trabalhos Científicos

**Título:** Variações Na Apresentação Do Exantema Por Herpes Vírus Simples: Relato De Caso.

**Autores:** BRENDA EMANUELLY DE CAMPOS FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR), BRUNA LUIZA THESOLIM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR), JOÃO PEDRO DE BARROS FERNANDES GAION (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR), GABRIELE VITORIA GERCIANO MACHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR), EDUARDO THESOLIM (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), DÉBORAH CARVALHO CAVALCANTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR)

**Resumo:** Herpes é uma infecção causada pelo vírus da família Herpesviridae, do tipo 1 ou 2, sendo o primeiro de acometimento principal em região de boca e lábios e o último em órgãos genitais. Este relato tem como objetivo apresentar um caso em que a infecção pelo Herpes Vírus Simples (HSV) mostrou-se disseminada, com características atípicas do vírus. Lactente de 1 ano e 6 meses, masculino, cursou com prostração e febre por 3 dias, refratária a analgésicos, associado a lesões planas eritematosas em região cervical e membros distais. Passados outros 3 dias, evoluiu com acentuação do exantema, apresentando lesões em formato de alvo, maculopapulares, também em face e tórax. Após 24 horas, as lesões variaram em aspecto e número, diferenciando-se em máculas eritematosas, pápulas e microvesículas pruriginosas, acometendo todo o corpo, acentuadas em tronco, região perigenital e nádegas, onde se coalesceram, formando placas eritematosas, com bordas bem definidas, poupando mucosas. Em região de tronco e nádegas, as lesões pioraram significativamente, arquetando halos arroxeados com coloração bastante acentuada e centro hipocrômico, progredindo para lesões acastanhadas com aspecto de queimadura de cigarro. Sem outros achados relevantes em exame físico. Paciente não se queixou de dor, apenas prurido, durante todo o processo infeccioso. Pela variação do exantema, apesar da resolução do quadro febril, foi realizada investigação para etiologias virais. Inicialmente levantada suspeita de reação alérgica e iniciado anti-histamínicos e corticoterapia, com melhora progressiva. Após análise dos exames laboratoriais solicitados, verificado Herpes Simplex - IgG não reagente e IgM reagente, confirmando o quadro de exantema desencadeado por herpes simples. A primoinfecção geralmente acomete crianças, com prevalência de positividade para HSV-1, por idade, sendo 25% com 2 anos de vida, 50% com 7 anos e 75% aos 15 anos. É caracterizada por lesões vesicoerosivas, febre e adenopatia com ou sem comprometimento do estado geral, durando cerca de 2 a 6 semanas. O diagnóstico da infecção baseia-se no quadro clínico, que costuma ser característico, ou seja, pródromo de ardência e dor, as vesículas surgem agrupadas, evoluindo para pústulas e posterior exulceração e formação de crosta, principalmente em genitália e lábios. Neste caso, tendo em vista o uso das medicações prévias ao diagnóstico e resolução do quadro, não foi utilizado o tratamento convencional (medicamentos antivirais). Ressalta-se que paciente não apresentava imunossupressão, tendo em vista que literatura traz formação de lesões mais intensas nessa situação. Tal estudo traz a importância de se pensar na infecção pelo HSV como diagnóstico diferencial para exantemas, tendo em vista que pode haver apresentação atípica, em locais não habituais e até mesmo ser assintomático. O diagnóstico precoce pode contribuir para o adequado tratamento, evitando medidas desnecessárias, assim como antecipar a melhora clínica do quadro.