

## Trabalhos Científicos

**Título:** Epidemiologia Das Internações Por Doença De Crohn E Colite Ulcerativa Em Crianças E Adolescentes.

**Autores:** HELAINE SILVA COLARES (FSCMPA), ALESSANDRA MARTINS (FSCMPA), ALESSANDRA CONTENTE VAZ (FSCMPA), PATRÍCIA HELENA OLIVEIRA PINTO FERREIRA (FSCMPA), GIZELY DE NAZARÉ FLEXA VIANNA DE CASTRO (FSCMPA), ISABELA COSTA VAZ (UEPA), FABIA NICOLE LIMA PEREIRA (UEPA), YASMIN CAVALLEIRO DE MACEDO MARANHÃO (UEPA), CECILIA VARELA PINHEIRO DE CASTRO (UFPA)

**Resumo:** As Doenças Inflamatórias Intestinais englobam duas grandes patologias: a Doença de Crohn e a colite ulcerativa, que podem se desenvolver a partir de fatores genéticos ou externos, ganhando destaque devido ao aumento da prevalência dos casos no país. Compreender o perfil epidemiológico das internações por Doença de Crohn em crianças e adolescentes nos últimos 5 anos. Trata-se de uma pesquisa de natureza epidemiológica, quantitativa e transversal, na qual foram extraídos dados secundários do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes à Morbidade Hospitalar do SUS, pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH), no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2024. Para o estudo, incluiu-se a faixa etária de idades inferiores a 1 ano a adolescentes de 14 anos. As variáveis incluídas no estudo foram: internações por mês nas regiões do país, faixa etária, sexo, cor/raça e caráter de atendimento. No período houveram 3.976 internações por doença de Crohn e colite ulcerativa, das quais 1.550 foram provenientes da região Nordeste, enquanto somente 208 na região Norte. A faixa etária predominante foi de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, com 1.732 hospitalizações para o período, seguida da faixa etária de 5 a 9 anos, com 1.089 internações. Além disso, 2.188 dos casos foram relativos ao sexo masculino, enquanto 1.788 foram do sexo feminino. 1.043 internações não preencheram os critérios de raça/cor, ao passo que houve um predomínio de pardos e brancos, com 1.490 e 1.362 hospitalizações, respectivamente. Por fim, ao que tange o caráter de atendimento, 2.516 foram admitidos em urgência e 1.460 trataram-se de internações eletivas. O presente estudo buscou descrever a epidemiologia das hospitalizações por Doença de Crohn e colite ulcerativa, constatando que no período analisado a maioria das internações ocorreram na região Nordeste, com predominância da faixa etária dos 10 aos 14 anos, em pessoas do sexo masculino, pardas e brancas, em caráter de urgência. O conhecimento destes dados permite direcionar a criação de medidas na área da saúde que visem a promoção da saúde e prevenção destas doenças no país.