



Trabalhos Científicos

Título: Manifestações Atípicas De Um Carcinoma Papilífero De Tireoide Em Criança: Relato De Caso

Autores: JULIA REGINA DE ANDRADE (UEM), LORRAN UILIAN BERBET DE SOUSA (UEM), RICARDO TEIICHI COSTA OIKAWA (DASA), FABIANE ALMEIDA SARMENTO (DASA), LETÍCIA DA SILVA GOMES (UEM)

Resumo: O carcinoma de tireoide corresponde a menos de 3% das neoplasias da infância, com incidência anual de 0,5 a 5 casos por milhão. É pouco frequente em menores de 10 anos, sendo mais comum no sexo feminino. Neste relato de caso observamos manifestações agressivas e atípicas desta doença rara nesta faixa etária. Paciente do sexo feminino, 8 anos, iniciou em outubro de 2023 com nódulos cervicais, emagrecimento, tosse e dispneia com diagnóstico de asma. Em janeiro de 2024 em uma exacerbação aguda foi transferida no Hospital Universitário Regional de Maringá. Admitida em mau estado geral, taquipneia, estridor laríngeo com falência respiratória e necessidade de intubação. Ao exame apresentava massas cervicais e tireoide lobulada e aumentada. Durante a intubação, foi visualizado na laringoscopia edema de glote com tumefações e sangramento. Tomografia com formação expansiva e mal delimitada em região de tireoide envolvendo a circunferência da traqueia, com lesão de cartilagens tireoide, cricoide e aritenóide, linfonodomegalias cervicais, consolidação pulmonar em lobo inferior direito, múltiplos nódulos de distribuição bilateral de até 1,5 cm sugerindo implantes pulmonares, espessamento pleural em segmento basal posterior de lobo inferior esquerdo. A ultrassonografia cervical demonstrou nódulos de tireoide TI-RADS V (Thyroid Imaging Reporting and Data System), vascularizados, em istmo (4 cm), lobo direito (3 cm) e linfonodomegalias. Paciente sob cuidados intensivos e tratamento de pneumonia, com suspeitas clínicas de tuberculose e doenças neoplásicas. Função tireoidiana normal. Baciloscopia, teste molecular de tuberculose e o teste tuberculínico negativos. Punção aspirativa por agulha fina de nódulos tireoidianos e de linfonodos cervicais, imprinting e biópsia de linfonodos com resultados sugerindo carcinoma papilífero de tireoide metastático. A paciente foi referenciada para o serviço de oncologia pediátrica do Hospital Erastinho de Curitiba para dar continuidade ao tratamento. O carcinoma papilífero de tireoide tem como principal forma de apresentação clínica nódulos assintomáticos e aparecimento de linfonodomegalia cervical. Nas crianças a invasão de cápsula e metástases ganglionares e pulmonares são mais frequentes do que no adulto. Sintomas como rouquidão, disfagia, tosse, estridor laríngeo e dispneia evidenciam doença mais agressiva e avançada. Chama atenção no caso descrito a evolução rápida do quadro clínico. Ademais, para o diagnóstico é importante o exame clínico e físico cuidadosos, ultrassonografia e estudo do material a partir da punção aspirativa por agulha fina. Por fim, este relato aborda um caso de carcinoma papilífero de tireoide em criança com quadro clínico pouco frequente, sendo necessário afastar diagnósticos diferenciais. Cabendo ao profissional de saúde sempre considerar todos os possíveis diagnósticos, a fim de um diagnóstico precoce para melhor direcionar o tratamento.