Trabalhos Científicos

Título: Perfil Clínico-Epidemiológico Da Avaliação Da Região Corporal Na Educação Infantil No Bairro Da Condor, No Município De Belém-Pará

Autores: LARISSA PINHEIRO VIANA (CESUPA), EMILSON BRASIL BARBOSA (CESUPA), JEANNE MARIA HORÁCIO JARDIM DA SILVA (CESUPA), MARIA JULIANA OLIVEIRA ROCHA (CESUPA), RAQUEL DO VALE TRINDADE (CESUPA), MARIA ELIZABETH CORRÊA RODRIGUES (CESUPA), NATÁLIA VELLOSO DA SILVA E SILVA (CESUPA), LUANA CASTANHEIRA DE FARIA (CESUPA), RAYSSA PINHEIRO MIRANDA (CESUPA)

Resumo: As lesões de pele em crianças são acontecimentos frequentes devido a maior vulnerabilidade por sua menor capacidade de defesa, associada a diversos fatores ambientais e patológicos. Entre as manifestações cutâneas mais comuns estão a xerose cutânea, cicatrizes e lesões descamativas. Avaliar a prevalência de afecções na região corporal de crianças em fase pré-escolar na EMEIF Antônio Carvalho Brasil, no bairro da Condor, no município de Belém-Pará. O presente trabalho utilizou informações de 151 prontuários de crianças que foram atendidas numa ação do Programa Saúde na Escola (PSE), na instituição EMEIF Antônio Carvalho Brasil, em 04 de abril de 2023. Os dados coletados utilizados foram: Idade, sexo, avaliação de couro cabeludo, avaliação da região corporal, problema adicional relatado/observado, hipótese diagnóstica e conduta. Os dados foram tabulados e organizados em gráficos e tabelas. O tipo de estudo realizado foi observacional, transversal, retrospectivo de prevalência. Os dados avaliados mostraram um total de 82 meninas e 69 meninos, dos quais respectivamente 37 e 33 crianças tinham lesões, e a idade variou entre 3 e 6 anos. Foi constatado dentre os principais acometimentos: 21 xeroses cutâneas, 17 cicatrizes hipercrômicas, 8 máculas hipocrômicas, 6 lesões descamativas, 6 escoriações, 4 lesões em estrófulos, 3 lesões hipercrômicas, pápulas eritematosas, linfonodos cervicais e 2 lesões verrucosas, vesículas pruriginosas, lesões crostosas e ptiríases albas. Em porcentagens 5,29% dos casos foram xerose cutânea , com a conduta de aumento da ingesta hídrica e uso de hidratantes dermatológicos. O segundo diagnóstico mais comum foi dermatite atópica com 3,31% tendo necessidade de mais investigação, e para os demais diagnósticos, com suas respectivas condutas houveram: 3 casos de dermatite seborreica, com prescrição de cetoconazol xampu 2%, 3 casos de pitiríase versicolo, prescrito cetoconazol creme, 2 casos de impetigo com prescrição de mupirocina pomada e 2 casos de escabiose, com a conduta de permetrina loção 5%. Aos com diagnósticos não comprovados, seguiram-se análises e houveram orientações aos pais acerca de boa higiene e hidratação. Constatou-se que as crianças atendidas na ação do PSE apresentaram prevalência significativa de xerose cutânea, seguida de dermatite atópica. Apesar de que a maioria das crianças não manifestaram alterações na avaliação da região corporal, aquelas com alteração correlacionaram suas queixas ao prurido e a presença de cicatrizes. O manejo das lesões de pele em crianças deve ser individualizada, levando em consideração as características clínicas de cada condição e a necessidade de intervenções específicas. A educação dos pais e cuidadores é fundamental para o sucesso do tratamento e prevenção de recorrências.