

## Trabalhos Científicos

**Título:** Intussuscepção Intestinal De Repetição Em Paciente Pediátrico: Um Relato De Caso

**Autores:** EMANUELA SANDRE SOLIGO RODRIGUES (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), EDUARDA BINOTTO ZANIN (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), GABRIELA FAZOLIN PEREIRA (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), FERNANDA DE CASTRO PEREIRA TOME (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), CAMILA DOS SANTOS (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), GUSTAVO JORGE MAFTUM (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS)

**Resumo:** A intussuscepção intestinal é uma emergência pediátrica que ocorre com maior frequência em crianças do sexo masculino, menores de 2 anos de idade. É caracterizada por uma invaginação do intestino proximal para dentro da luz do intestino proximal. Pode apresentar-se com sintomas de obstrução intestinal. Paciente, feminino, 3 anos de idade, buscou atendimento médico no PS devido quadro de febre, emêse, dor abdominal, inapetência e disenteria. Realizado US de abdome total evidenciando intussuscepção íleo-íleal em fossa ilíaca esquerda. Apresentou melhora espontânea, sem necessidade de intervenção. Paciente com histórico de três internamentos prévios devido intussuscepção intestinal, com intervalo de 3 meses entre elas. No primeiro quadro foi necessário realizar laparoscopia. Apenas no último caso foi identificado a possível causa, com citomegalovírus reagente. A intussuscepção intestinal é uma das principais causas de abdome agudo na infância, sendo mais comum em lactentes. É mais prevalente em menores de 2 anos, sendo pouco frequente na faixa etária escolar, como é o caso do paciente. A tríade clássica está presente em menos de 50% dos casos, que consiste em dor abdominal em cólica, fezes em “geléia de framboesa” e massa abdominal palpável. A maioria dos casos não é patológica, sendo de origem idiopática, secundária a infecções virais. O tratamento clínico é preferível ao tratamento cirúrgico, devido a altas taxas de resolução e baixa taxa de mortalidade. Alguns casos podem ter resolução espontânea, como evidenciado no caso acima. A intussuscepção intestinal é uma importante causa de obstrução intestinal em lactentes e requer agilidade no reconhecimento e abordagem devido riscos de complicações. Assim, como no caso relatado, é de extrema importante considerar esse diagnóstico em demais faixas etárias para que o tratamento seja instituído e melhor prognóstico atingido.