



22 A 26
DE OUTUBRO
DE 2024
FLORIANÓPOLIS - SC



Trabalhos Científicos

Título: Proporção De Intoxicação Exógena Por Raticida Para Fins De Tentativa De Suicídio No Nordeste

Autores: HENDERSON RHAVY DE JESUS LUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO BAIANO), ISADORA CARVALHO DE SOUSA (UNIVERSIDADE POTIGUAR), KAROLAYNE ARAÚJO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO BAIANO), ANA LUÍSA FREITAS DE SOUSA (UNIVERSIDADE POTIGUAR)

Resumo: Na região Nordeste, o suicídio entre adolescentes constitui um grave problema de saúde pública que permeia diversas vulnerabilidades socioeconômicas e psicoafetivas associadas a facilidade de acesso a produtos extremamente tóxicos, como diversos raticidas. Compreender o perfil epidemiológico do suicídio por raticida entre adolescentes na região nordeste. Trata-se de um estudo transversal cujo os dados foram obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/SUS) através da plataforma do DATASUS. Considerou-se a intoxicação exógena por raticida para fins de tentativa de suicídio na abrangência Nordeste entre indivíduos com 10 a 19 anos. Foram analisadas as variáveis sexo, cor/raça e as unidades da federação desses casos entre o período de 2013 e 2023. Ademais, utilizou-se dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022. Por fim, foram excluídos dessa análise dados sem informação prévia. Nesse período, foram registrados 1.806 casos na região nordeste, com prevalência (p) de 21,8 notificações por 100.000 habitantes. Em relação ao sexo, foram 519 pacientes masculinos, $p=12,3/100.000$, enquanto do sexo feminino notificaram 1.287 pacientes, $p=31,7/100.000$. Entre adolescentes nordestinos, no quesito raça/cor, brancos representaram 164 casos, $p=1,9/100.000$, pretos 109 casos, $p=1,3/100.000$, pardos 1.069 casos, $p=12,9/100.000$, amarelos 10 casos, $p=0,12/100.000$ e indígenas 3 casos, $p=0,04/100.000$. Entre as unidades da federação, apesar do estado da Bahia apresentar maior número, 449 notificações, $p=21,6/100.000$, tiveram prevalências mais representativas, os estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Pernambuco, respectivamente, distribuídos 289 ($p=57,2/100.000$), 110 ($p=32,6/100.000$), 181 ($p=31,1/100.000$) e 354 ($p=26,4/100.000$). Diante disso, observa-se que as tentativas de suicídio entre jovens nordestinos com a intoxicação por raticida constitui um cenário preocupante mais prevalente entre as mulheres, os indivíduos pardos e a população alagoana. Por fim, subnotificações e dados incompletos representam limitações do presente estudo.