

Trabalhos Científicos

Título: Tratamento Com Ácido Valpróico E O Risco De Pancreatite Aguda Na Pediatria: Um Relato De Caso

Autores: CAROLINA PACCINI CAVALCANTE (UNIFOR), LIA CAMURÇA COSTA (UNIFOR), ILA DESIRÈE TENEDINI CARVALHO LIMA (UNIFOR), THIAGO BOMFIM DE SABOIA (UNIFOR), JÚLIA MARIA ABREU DE ALBUQUERQUE (UNIFOR), LUMA MARIA FIGUEIREDO SANTANA (UNIFOR), ROSÂNGELA PINHEIRO GONÇALVES MACHADO (UNIFOR), ANA CAROLINA VICTOR NOBRE (UNIFOR)

Resumo: A principal medicação utilizada para tratamento de pacientes com epilepsia e transtornos de humor é o Ácido Valpróico. No entanto, seu uso tem sido controverso, devido ao aumento de casos de pancreatite aguda na população pediátrica usuária dessa medicação. Esse trabalho trata-se de um caso de pancreatite aguda induzido pelo uso de ácido valpróico, em uma paciente do sexo feminino, portadora de TEA internada em hospital terciário, no ano de 2024, que visa destacar o papel do pediatra na necessidade de aprofundamento dos estudos da medicação e seus efeitos na população em questão para a consequente prevenção e tratamento desses casos. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, tipo relato de caso, obtido através da análise dos prontuários da paciente e de artigos de bases de dados: LILAS, BVS, PubMed e Scielo, para validar as hipóteses do caso. Paciente com TEA do sexo feminino, 10 anos, em uso de ácido valproico há 3 meses, iniciou em 18/05/24 quadro de dor abdominal difusa e vômitos, sem febre. Foi levada à UPA, onde foram realizados exames laboratoriais que evidenciaram Hb 13,4, Ht 39,1, Leuco 10.500 (segm 69,6%, bast 0, linfo 17%), plaq 410.000, amilase 212, lipase 2.478, TGO 64, TGP 59, PCR 2.25, K 4,5, Na 137, Ur 27.3, Cr 0,42. Ao exame físico, apresentava abdome semigloboso por adiposidade, RHA+, flácido, timpânico, dor discreta à palpação de hipocôndrio direito e hipogástrico. Paciente foi encaminhada ao hospital terciário onde foi realizada USG abdominal cujo laudo confirmou a pancreatite aguda. Apesar de o ácido valproico ser uma medicação eficiente para o tratamento de epilepsia e transtornos de humor relacionados ao TEA, há um número considerável de casos de pancreatite aguda relacionada ao uso da substância, como o relatado neste trabalho, em que há aumento considerável de enzimas pancreáticas, sem outra causa provável. Desse modo, faz-se necessário mais estudos para comprovar a relação entre a medicação e a indução dessa injúria. Enquanto isso, deve-se substituir o uso dessa medicação na faixa etária pediátrica para prevenir a ocorrência de pancreatite aguda.