



22 A 26
DE OUTUBRO
DE 2024
FLORIANÓPOLIS - SC



Trabalhos Científicos

Título: Bloqueio Atrioventricular Total Em Decorrência De Lúpus Eritematoso Neonatal: Um Relato De Caso.

Autores: ANA LUIZA SIQUEIRA ROSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), ROBERTA ORIANA ASSUNÇÃO LOPES DE SOUSA (UNIFACID), ANGÉLICA MARIA ASSUNÇÃO DA PONTE LOPES (HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA- DF), ALANA JESSYCA COSTA SIPAUBA (UNIFACID), AMANDA CARLOS FERREIRA DUARTE (UNIFACID), ANA GÉSSICA PAIVA OLIVEIRA BARROS (UNIFACID), FELIPE AUGUSTO BENEVENUTO SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI), ILANA FREIRE SOUSA (UNIFACID), JOSIELLY FERREIRA BACELAR (UNIFACID), JOSUE ASSUNÇÃO DA PONTE LOPES (UNIFACID), JÚLIA RABÊLO EVANGELISTA (UNIFACID), LAÍS MARQUES SAMPAIO (UNIFACID), LISANDRA LEANDRO DO NASCIMENTO (UNIFACID), MARIA AMANACI CAVALCANTE SOARES (UNIFACID), SARA CRISTINA SARAIVA BATISTA DINIZ (UNIFACID)

Resumo: O Lúpus Eritematoso Neonatal (LEN) é uma patologia autoimune, rara que ocorre em certa de 2% dos recém-nascidos na primeira gestação das mães portadoras de autoanticorpos. Cerca de 50% das mães são assintomáticas e portadoras dos anticorpos no momento do parto. Os principais envolvidos são o Anti-Ro e Anti-La que podem desencadear alterações hematológicas, cutâneas, hepatológicas e, em 2% dos casos, alterações cardíacas. Recém-nascido, sexo masculino, a termo, peso 3,365 kg, nascido de parto cesáreo devido a bradicardia fetal. Apgar8/9, sem necessidade de reanimação. Mãe sem comorbidades. Ao exame físico, bom estado geral, acianótico, afebril, anictérico. Ausculta cardíaca e respiratória: ritmo regular em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopro, frequência cardíaca 48 batimentos por minuto, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente sem ruídos adventícios. Abdome flácido, indolor fígado palpável 2 cm abaixo do rebordo costal. Sem outras alterações ao exame. Exames complementares: FAN nuclear pontilhado 1:160, Anti-Ro: 240, Anti-La: 0,7, VHS 10, PCR 5, AST 24, ALT 20, Cr 0,15, Bilirrubinas Total: 5,5, Bilirrubina direta: 0,1, Bilirrubina indireta: 5,4, hemoglobina: 11,7, Leucócitos 9.050 e plaquetas 656.000. Ecocardiograma: sem alterações. Eletrocardiograma: bloqueio atrioventricular total (BAVT). Exames maternos: FAN nuclear pontilhado 1:640, Anti-Ro: 240, anti-La não reagente. Com 1 ano de idade, criança realizou cirurgia cardíaca de implante de marcapasso. Atualmente, segue em acompanhamento com reumatologia e cardiologia pediátrica. Discussão: Segundo a literatura, de 1 a 2% das grávidas portadoras de Anti-Ro tem filhos com lúpus neonatal, independente, da manifestação de sintomas. Em relação ao recém-nascido, as manifestações do LEN podem ser alterações dermatológicas, cardíacas, hepáticas, hematológicas dentre outras. Sendo o BAVT descrito como o evento clínico-patológico mais importante do LEN, por sua gravidade e irreversibilidade. Conclusão: O BAVT é a manifestação mais grave do LEN, associada a uma elevada morbimortalidade. O diagnóstico precoce e o acompanhamento conjunto com reumatologista e cardiologista pediátricos possibilitam uma abordagem terapêutica oportuna, refletindo em melhora no prognóstico e expectativa de vida do paciente.