



Trabalhos Científicos

Título: Treinamento De Profissionais No Transporte Neonatal Em Um Estado Do Nordeste.

Autores: PATRÍCIA FRANCO MARQUES (HOSPITAL UNIVERITÁRIO UNIDADE MATERNO INFANTIL-UFMA); SILVIA HELENA CAVALCANTE DE SOUSA (HOSPITAL UNIVERITÁRIO UNIDADE MATERNO INFANTIL-UFMA); MARIA JOSÉ SILVA DE SOUSA (HOSPITAL UNIVERITÁRIO UNIDADE MATERNO INFANTIL-UFMA); ROBERTA BORGES CORREIA DE ALBUQUERQUE (HOSPITAL UNIVERITÁRIO UNIDADE MATERNO INFANTIL-UFMA); MARYNÉA SILVA DO VALE (HOSPITAL UNIVERITÁRIO UNIDADE MATERNO INFANTIL-UFMA)

Resumo: Introdução: Algumas vezes os recém-nascidos (RN) de risco necessitam de transporte intra ou inter-hospitalar, devendo ser realizado de maneira adequada pelos profissionais de saúde. Objetivos: Descrever a frequência de treinamentos em transporte neonatal de RN de risco por profissionais de saúde em um Estado do nordeste brasileiro. Métodos: Estudo transversal descritivo com dados de todos os cursos de transporte neonatal realizados no Estado do Maranhão, no período de 2012 a 2013, pelo PRN (Programa de Reanimação Neonatal) da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria). O curso tem carga horária de 8 horas, consta de um pré e pós-teste, aula teórica e quatro aulas práticas. São abordados os seguintes temas: etapas iniciais do transporte, manuseio da incubadora de transporte, do equipamento para ventilação, do oxímetro e da bomba perfusora, além do cálculo do risco, estabilização clínica pré-transporte, suporte ventilatório e o transporte propriamente dito. Resultados: Foram realizados 6 treinamentos, no período do estudo, com 68 participantes. Destes 60 eram médicos e 8 eram enfermeiros. A aprovação foi alcançada por 67 alunos, sendo que 1 foi reprovado. Conclusão: O treinamento de profissionais de saúde de nível superior pode assegurar a indicação correta e o transporte neonatal adequado dos recém-nascidos de risco. Desta forma, poderá contribuir para a redução da morbimortalidade neonatal e garantir a sobrevivência com menos sequelas dos recém-nascidos que necessitam ser submetidos ao transporte inter ou intra-hospitalar.