

5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL  
DE REANIMAÇÃO NEONATAL



27 a 29 de março de 2014  
Hotel Serrano - Gramado - RS



## Trabalhos Científicos

**Título:** Anóxia Perinatal E Mortalidade Neonatal: Análise De Um Serviço De Referência Estadual

**Autores:** GLÁUCIA DE OLIVEIRA MOREIRA (UFRR/HMINSN)

**Resumo:** Introdução: A anóxia perinatal ainda é uma das principais causas de óbito no Brasil e sua incidência oscila de 2 - 4 por 1.000 nascimentos a termo, com prevalência de cerca 2% dos nascidos vivos. A taxa de mortalidade dos RNs asfixiados varia de 20 a 50%. Objetivos: Avaliar as principais causas de óbito relatadas em um serviço neonatal de referência estadual e o relato de anóxia perinatal como uma das causas mencionadas nas declarações de óbito. Métodos: Estudo transversal retrospectivo, com análise dos óbitos investigados pela Comissão de Óbito Hospitalar de um serviço de referência materno infantil de janeiro a dezembro de 2013. Resultados: Verificou-se a ocorrência de 18 óbitos neonatais, o que equivale a 35,3%, sendo que destes 38,8% apresentavam anóxia perinatal como uma das causas de óbito, mal formação e prematuridade foram apontados em 27,7% cada um e infecção em 5,5%. Dos relatos de anóxia, 11,1% ocorreram em bebês estrangeiros vindos de países fronteiriços sem transporte adequado (término de oxigênio durante o transporte) e 5,5% eram indígenas trazidos de área distante e nascidos fora de unidade hospitalar. Conclusão: A anóxia perinatal ainda é um grande desafio a ser enfrentado, não só nacionalmente, mas também deve ser colocado em pauta nas discussões com lideranças internacionais de regiões de fronteira; bem como deve ser especialmente abordado de maneira mais contundente em populações que vivem à margem do sistema de saúde urbano convencional.