



Trabalhos Científicos

Título: Clampeamento Precoce De Cordão: Pra Quê A Pressa?

Autores: AMANDA FREIRE VIEIRA (UFOP); TÚLIO HENRIQUE VERSIANI DE OLIVEIRA (UFOP); WALESKA BRITO RABELO (UFOP); MARIA CRISTINA VEIGA ARANHA NASCIMENTO (UFOP); FLÁVIA CARDOSO RODRIGUES (UFOP-HMOB)

Resumo: INTRODUÇÃO: Recém nascido (RN), a termo, adequado para a idade gestacional, sexo masculino, nascido em 12/01/2016. Pré-natal e parto sem intercorrências. Mãe Rh negativo. Realizado clampeamento precoce de cordão. Evoluiu com anemia e icterícia neonatal precoce, sem indicação de fototerapia. OBJETIVOS: A partir do caso clínico em que o RN apresentou uma anemia provavelmente devido ao clampeamento precoce do cordão com a justificativa de ser filho de mãe RH negativo, objetivou-se esclarecer a indicação ou não do clampeamento precoce de cordão. METODOLOGIA: Realização de uma revisão bibliográfica não sistemática sobre o clampeamento precoce de cordão por meio de artigos científicos recentes em plataformas eletrônicas, utilizando palavras chaves: clampeamento precoce de cordão e correspondente na língua inglesa. RESULTADOS: Os estudos demonstraram que não houve diferença estatística no tempo do 3º período do parto, nas taxas de hemorragias pós parto, nas manifestações clínicas da icterícia neonatal, no desenvolvimento de policitemia e na transmissão vertical do HIV entre os grupos de clampeamento precoce e tardio de cordão. Além disso, os estudos demonstraram benefícios adicionais na realização do clampeamento tardio de cordão, como: redução de 61% na taxa de anemia requerendo transfusão de sangue, redução de 59% na taxa de hemorragia intraventricular, redução de 62% na taxa de enterocolite necrosante, redução de 29% na taxa de sepsis neonatal e redução de 52% na taxa de transfusões de sangue para bebês prematuros com hipotensão. CONCLUSÃO: O clampeamento precoce do cordão umbilical (< 1 minuto após o nascimento) somente deve ser realizado quando o recém nascido necessitar de ser movido imediatamente para a reanimação. Nos demais partos, atrasar o clampeamento do cordão 1 a 3 minutos após o nascimento.