



## Trabalhos Científicos

**Título:** Distribuição Dos Instrutores Do Programa De Reanimação Neonatal Em Hospitais Públicos Do Estado De São Paulo

**Autores:** HELENILCE PAULA FIOD COSTA (SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO (SPSP); SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP); MANDIRA DARIPA KAWAKAMI (SPSP/ SBP); CLAUDIA TANURI (SPSP/ SBP); SÍLVIA HELOÍSA MOSCATEL LOFFREDO (SPSP/ SBP); ANA MARIA ANDRELLO G. PEREIRA DE MELO (SPSP/ SBP); CHEUNG HEI LEE RUSSO (SPSP/ SBP); MARIA ÂNGELA SARAIVA (SPSP/ SBP); BETTINA BARBOSA DUQUE FIGUEIRA (SPSP/ SBP); RENATO OLIVEIRA DE LIMA (SPSP/ SBP); INSTRUTORES DO PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL DA SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO/SBP (SPSP/ SBP)

**Resumo:** Introdução: uma das metas do PRN-SBP é formar no mínimo um instrutor em cada instituição no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) com 7500 nascidos vivos ao ano. Objetivo: avaliar a presença de pelo menos um instrutor do PRN-SBP que atua nas maternidades da rede SUS com 7500 partos ao ano na Capital e no Interior do Estado de São Paulo (ESP). Método: Estudo transversal sobre o mapeamento dos instrutores do PRN-SBP atuantes nos hospitais públicos ou conveniados ao SUS com 7500 partos em 2014, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram analisados: número de instrutores, tipo de gestão municipal ou estadual, segundo a atuação na Capital ou Interior. Resultados: Em 2014, ocorreram 625.750 partos nos 645 municípios paulistas, dos quais 311.120 (50%) em 175 hospitais públicos com 7500 partos, que possuíam 170 instrutores do PRN-SBP. Dos 175 hospitais, 118 (67%) eram municipais, incluindo as entidades filantrópicas, localizados predominantemente no Interior (n=101) onde nasceram 139.353 (45%) RN do ESP. Dos 101 hospitais municipais do Interior, 8 não possuíam instrutor e foram responsáveis por 6% (8.231) dos partos em 2014. Dos 17 hospitais municipais da Capital, 94% (16) tinham um instrutor formado. Nos 57 hospitais estaduais e 1 federal ocorreram 120.713 partos em 2014, sendo 74.191 (61%) no Interior distribuídos em 38 hospitais. Destes, 5 (13%) não possuíam instrutor e foram responsáveis por 4.935 (7%) nascidos vivos em 2014. Os 19 hospitais estaduais da Capital possuíam pelo menos um instrutor em reanimação neonatal. Conclusão: A grande maioria (95%) dos nascimentos no ESP ocorreu em instituições hospitalares públicas ou conveniados ao SUS com pelo menos um instrutor formado pelo PRN-SBP. Esforços contínuos para disseminação das condutas de Reanimação Neonatal devem ser mantidos, principalmente nas regiões mais afastadas da Capital, a fim de auxiliar na redução da mortalidade neonatal.