

31 DE MARÇO
A 2 DE ABRIL DE 2022
CENTRO DE CONVENÇÕES
SALVADOR - BA



Trabalhos Científicos

Título: Óbitos Por Síndrome De Aspiração Neonatal Na Bahia De 2009 A 2019

Autores: JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ BARRETO COSTA (EBMSP), MAGNÓLIA MAGALHÃES DE CARVALHO (EBMSP), MARIANA OLIVEIRA ABREU (EBMSP), RENATA REQUIÃO HOLANDA (EBMSP), FILIPE JOSÉ SILVA ANDRADE RIBEIRO (EBMSP)

Resumo: INTRODUÇÃO: A síndrome de aspiração neonatal é uma importante causa de morbimortalidade neonatal, podendo ocorrer a partir da aspiração de mecônio, líquido amniótico, muco, sangue, leite e alimentos regurgitados. OBJETIVO: Avaliar os óbitos por síndrome de aspiração neonatal na Bahia no período de 2009 a 2019. MÉTODOS: Estudo epidemiológico descritivo com coleta de dados no Sistema de Informações em Saúde (TABNET) do SUS, utilizando as variáveis: total de óbitos, faixa etária de 0 a 27 dias de vida, sexo, local de ocorrência e duração da gestação. RESULTADOS: Registrou-se 1003 óbitos por síndrome de aspiração neonatal nesse período na Bahia, sendo 872 (86,9%) no período neonatal precoce e 131(13,0%) no período neonatal tardio. A taxa de mortalidade neonatal por síndrome de aspiração foi 0,44. A taxa de mortalidade neonatal precoce, 0,38 e a taxa de mortalidade neonatal tardia, 0,05. Destaca-se que 77 óbitos (7,6%) ocorreram em Salvador. Durante os 11 anos analisados, o maior número de casos registrados foi 113 (11,2%), em 2013, e o menor número, 74 (7,3 %), em 2019. Quanto à duração das gestações, 32 (3,1%) dos casos duraram menos de 22 semanas, 9 (0,008%) casos entre 22 e 27 semanas, 20(1,9%) casos entre 28 e 31 semanas, 81(8,0) entre 32 e 36 semanas, 601 (59,9%) entre 37 a 41 semanas e 58 (5,7%) entre 42 semanas e mais. Acerca da faixa etária detalhada desses óbitos, houve 369 (33,9%) em menos de 24 horas, sendo 79 (7,2%) em menos de 1 hora de vida, 192 (17,6%) entre 1 e 11 horas e 83 (7,6%) entre 12 e 23 horas. A respeito do local de ocorrência, destaca-se que 920 (90,0%) óbitos ocorreram em hospitais e 37 (4,9%) em domicílio. CONCLUSÃO: Aspirações foram, então, relevantes causas de morte na população neonatal da Bahia, sobretudo no período neonatal precoce. Nesse sentido, faz-se clara a importância da assistência neonatal de qualidade para estabilizar os casos, principalmente na primeira hora de vida, evitando futuros óbitos.