

Trabalhos Científicos

Título: Púrpura Pigmentar Crônica Liquenóide - Um Importante Diagnóstico Diferencial De Vasculites

Autores: NATASHA SANTOS MATA (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); INGRID HERTA ROTSTEIN GREIN (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); THAIS CUGLER MENEGHETTI (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); CHRISTINA FEITOSA PELAJO (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); LORIS LADY JANZ JUNIOR (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); MARCIA BANDEIRA (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE)

Resumo: Introdução: Dermatoses purpúricas pigmentadas representam um grupo de dermatoses caracterizada clinicamente por petéquias e púrpuras não palpáveis sobre as extremidades inferiores. Podem ser divididas em cinco entidades clínicas: dermatose purpúrica pigmentar progressiva (doença Schamberg), púrpura anular telangiectásica (doença Majocchi), líquen aureus, dermatose purpúrica pigmentada liquenóide (Gougerot -Blum) e eczematóide como púrpura de Doucas e Kapetanakis. Há uma significativa superposição clínica e histológica entre essas enfermidades e deve-se investigar se constituem quadros distintos ou constituem variantes clínicas de um mesmo processo patológico. Descrição do caso: Paciente de 10 anos iniciou quadro de mancha violácea em membro inferior esquerdo e planta do pé ipsilateral. Relatava episódios de gengivorragia ao escovar os dentes. Sem outras queixas hemorrágicas. Associado ao quadro apresentava plaquetopenia. Iniciado tratamento com colchicina, sendo acrescentado, posteriormente, prednisona e hidroxicloroquina. Discursão: As púrpuras pigmentares liquenóides constituem um grupo de enfermidades crônicas com diferentes formas de apresentações, com etiopatogenia pouco conhecida, porém com particularidades comuns entre si. Infelizmente, o tratamento destas condições, até agora, tem sido insatisfatória. O diagnóstico correto de uma erupção purpúrica pigmentada é importante para tranquilizar os pais sobre a natureza benigna, porém crônica e muitas vezes angustiante dessas condições. Conclusão: Embora seja apenas um quadro de manifestações dermatológicas, é de extrema importância o conhecimento desse grupo patológico pelos especialistas da reumatologia, já que é um importante diagnóstico diferencial de vasculites.