



Trabalhos Científicos

Título: úlcera Crônica Abrindo O Quadro De Lúpus Eritematoso Sistêmico. Relato De Caso

Autores: ANA MARIA SOARES ROLIM (OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE); ANA GABRIELA PRADO (OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE); THAIS BANDEIRA (OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE); CÉLIA MARIA SILVANY (OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE)

Resumo: INTRODUÇÃO: O Lupus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas, por ser uma doença inflamatória multissistêmica do tecido conjuntivo. As manifestações cutâneas do LESJ podem ser diversas dentre elas, rash malar, lúpus discoide, vasculite leucocitoclástica, vasculites/úlceras nas pernas, urticária, etc , de acordo com suas características clínicas e histológicas. A vasculite cutânea pode ser o primeiro sinal, diretamente relacionada com a sua atividade inflamatória, e anteceder outras manifestações de doença. A vasculite cutânea é identificada em 20% a 70% dos casos de Lupus Eritematoso Sistêmico. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 13 anos, história de úlcera crônica de 5 meses em membro inferior esquerdo. Previamente tratada com antibióticos com hipótese de infecção. Posteriormente tratada com antimonial pela suspeita de Leishmaniose tegumentar. Como não apresentava melhora foi internada para investigação. Ao exame além da lesão ulcerada (fig 1,2 e 3), observado lesão eritematosa fixa e plana em região malar, em "asa de borboleta", levemente descamativa (fig 4). Exames laboratoriais: Rk39 negativo, culturas da lesão negativas, reação de Montenegro negativa, mielograma sem achados específicos, FAN (Hep2) positivo, Anti DNA positivo, Coombs direto positivo, Anti SSA e Anti SSB não reagentes, Anticardiolipina IgG e IgM não reagentes. Exames realizados no internamento evidenciaram ainda glomerulonefrite. Iniciado corticoterapia com êxito. DISCUSSÃO: De acordo com estudo multicêntrico nacional as manifestações iniciais mais frequentes no LESJ são: artrite, citopenia, presença de anti-DNA, fotossensibilidade e nefrite. Como na pediatria a proporção de Lúpus Eritematoso Sistêmico é mais elevada que o Lúpus cutâneo, exames laboratoriais foram solicitados buscando outras manifestações para o diagnóstico de LESJ. CONCLUSÃO: O caso relatado reitera o pleomorfismo dessa entidade e alerta para possibilidade de LESJ em pacientes adolescentes do sexo feminino com úlcera crônica em pernas.