

Trabalhos Científicos

Título: Doença Inflamatória Intestinal De Início Extremamente Precoce: Relato De Caso.

Autores: MARIA OSANA DA SILVA ANTONIO FILHO (UFMS), ALEXANDRE DA SILVA LEOPOLDINO (UFMS), ISABELLY COSTA MACHADO GOLFETO (UFMS), LEONARDO RODRIGUES RESENDE (UFMS), GABRIEL GOUVEIA COELHO DE MORAES (FIOCRUZ), PAMELA RIBEIRO PEREIRA (UFMS), MICHELLE OLIVEIRA IWATA (UFMS)

Resumo: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são um grupo de doenças, cuja incidência vem aumentando na faixa pediátrica, sendo mais comum na adolescência, sobretudo em maiores de 6 anos. O curso clínico é mais agressivo nas crianças do que em adultos, aumentando a morbidade à medida que a idade de início é mais precoce, devido à influência genética mais marcada, se relacionando também com erros inatos da imunidade. As DII, incluem a doença de Crohn, retocolite ulcerativa e colite indeterminada. Parada do crescimento e sintomas articulares, podem preceder a diarreia, outros sintomas extra intestinais são comuns, como atraso puberal. É sempre importante avaliar se há história familiar positiva. Em relação à colite, são classificadas como leve, moderada e grave. "Paciente do sexo masculino iniciou com diarreia e sangue nas fezes, associado a cólicas aos 8 meses. Estava como única fonte láctea aleitamento materno, aventada hipótese de APLV, sendo realizada dieta materna de exclusão do leite de vaca, com melhora temporária dos sintomas já que aos 12 meses de vida, volta a apresentar sangue vivo nas fezes e diarreia, com piora progressiva, sem melhora após alteração da dieta da mãe. Evoluiu com anemia refratária ao tratamento convencional, sendo necessário hemotransfusão. Realizada investigação etiológica, coprocultura positiva para *Aeromonas hydrophila*, tratada com ciprofloxacino porém sem melhora dos sintomas. Cintilografia descartando divertículo de meckel. Colonoscopia com biópsia, evidenciou enantema, erosões aftoides mais evidentes em colon esquerdo, com biópsia de colite crônica inespecífica, feito, desse modo, diagnóstico de doença inflamatória de início extremamente precoce e iniciado tratamento com prednisolona e azatioprina com melhora transitória porém após 5 anos de tratamento apresentou recaída com quadro grave com necessidade de internação e transfusão iniciado, desse modo, infliximabe o qual mantém uso desde então. Realizado ainda investigação genética com exame não detectando erros inatos da imunidade." "Paciente com início precoce de sintomas de doença inflamatória intestinal, com 8 meses de idade, evoluiu com necessidade de uso de imunobiológico para controle de sintomas fazendo seguimento ambulatorial com gastropediatria." Apesar de ser uma patologia extremamente rara na faixa etária pediátrica principalmente quando em menores de 6 anos, a hipótese de doença inflamatória intestinal não deve ser esquecida. O reconhecimento precoce implica em uma melhor evolução sendo importante também descartar imunodeficiências visto incidência na faixa etária pediátrica.