



# CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCÊNCIA

Florianópolis | SC

1 a 4 de novembro | 2012

## Trabalhos Científicos

**Título:** Transtornos Psiquiátricos E Abuso De Substâncias Na Adolescência

**Autores:** THAMYRIS THÉ DE HOLANDA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); THAIS MARTINS FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); TATIANA MATOS FERREIRA DE MELLO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); MARIANA VASCONCELOS FROTA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); MANOELA BEZERRA PAZ DE AGUIAR (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); MARINA FRANCISS TAMIETTI (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); SOFIA TEXEIRA GOMES (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); MARINA BIZERRIL NOGUEIRA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); CAMILA ARAGÃO BORGES (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); ANTÔNIA NAYANNE DE ALMEIDA LIMA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA)

**Resumo:** Objetivo: Investigar e compreender a associação de quadros depressivos e uso dessas substâncias especificamente em adolescentes, de acordo com a faixa etária e o sexo, e as possíveis consequências que a adicção possa acarretar na vida dos jovens a curto, médio e longo prazo. Metodologia: O método utilizado foi a busca sistemática através de bases de dados (SciELO, PubMed e Lilacs) com busca das palavras-chaves: “depressão”, “adolescência”, “adolescente”, “abuso de substâncias”, “dependência química”, “substâncias psicoativas”, “comorbidades”, ‘cannabis’, ‘drogadição’. Resultados: Foram revisados artigos referentes à depressão e ao uso de substâncias psicoativas em adolescentes de diversas localidades do mundo. As principais drogas estudadas foram álcool, cigarro, maconha (cannabis), crack e cocaína. Confirmou-se que muitos adolescentes com transtorno depressivo, apresentam comorbidade psiquiátrica, entre elas o abuso de substâncias entorpecentes. Além disso, diversos estudos provam que a inversão cronológica dos fatores tem o mesmo resultado, ou seja, os usuários de substâncias psicoativas também têm maior risco de desenvolver transtornos psiquiátricos como síndrome do pânico e depressão. Os dados mostram, ainda, que os transtornos de conduta podem persistir mesmo após o fim do quadro depressivo do adolescente. Conclusão: O transtorno depressivo é um dos distúrbios psiquiátricos mais comuns na adolescência e o mais prevalente quando associada ao uso de substâncias psicoativas, independente da faixa etária. Existe uma forte relação entre uso de substâncias psicoativas e transtornos psiquiátricos na adolescência sendo necessário, portanto, reconhecê-las, a fim de realizar abordagens terapêuticas adequadas e programas de prevenção eficientes.